


FUNZIONI COMPOSTE



$$f: A \rightarrow B$$

$$g: B \rightarrow C$$

g composto f
(g DOPO f)

$$g \circ f: A \rightarrow C$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

ESEMPIO

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = x + 1$$

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1$$

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = (x+1)^2$$

$$f(x) = \sqrt{x};$$

$$g(x) = x^2 - 1.$$

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1$$

Dato che l'insieme immagine di g non è incluso nel dominio di f , non è possibile comporre $f \circ g$. Per farlo devo restringere il dominio di g . Infatti, se ad es. partissi da $x=0$, avrei che $g(0) = -1$ e non esisterebbe $f(g(0))$.

Allora impongo che sia $g(x) = x^2 - 1 \geq 0$, cioè $x \leq -1 \vee x \geq 1$

Dunque se

$$g: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) \quad f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

si ha:

$$f \circ g: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 1) = \sqrt{x^2 - 1}$$

COMPOSURE

281 $f(x) = 2 - x;$

$g(x) = 3x + 2.$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2) = 2 - (3x + 2) = -3x$

$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2 - x) = 3(2 - x) + 2 = 6 - 3x + 2 = -3x + 8$

$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

282 $f(x) = 3x^2 - 2x;$

$g(x) = x - 3.$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x^2 - 2x) = 3x^2 - 2x - 3$

$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 3) = 3(x - 3)^2 - 2(x - 3) =$
 $= 3(x^2 - 6x + 9) - 2x + 6 = 3x^2 - 18x + 27 - 2x + 6 =$
 $= 3x^2 - 20x + 33$

283 $f(x) = x^3 - 1;$

$g(x) = 1 - 3x.$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(1 - 3x) = (1 - 3x)^3 - 1 =$
 $= \cancel{1} - 9x + 27x^2 - 27x^3 - \cancel{1} = -27x^3 + 27x^2 - 9x$

$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3 - 1) = 1 - 3(x^3 - 1) = -3x^3 + 4$

$$f(x) = \frac{1}{x};$$

$$g(x) = x^2 + 1.$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^2 + 1 = \frac{1}{x^2} + 1$$

Così com'è la composizione non potrebbe avvenire:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

DIVERSI

Su \mathbb{R}^+ l'immagine di g è $[1, +\infty)$

Ma se cambiamo così

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

↑
perché 0 non è l'immagine di alcun elemento tramite g
 $x^2 + 1 \neq 0 \quad \forall x$

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Date le funzioni $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$, $g(x) = x + |x|$,

- determina il loro dominio A , B e la loro intersezione C ;
- stabilisci per quali $x \in C$ risulta $f(x) \geq g(x)$;
- trova $f \circ g$ e $g \circ f$ e verifica che $f \circ g = g \circ f$ solo per $x = -2\sqrt{3}$.

$$\left[\text{a) } A = [-4; 4], B = \mathbb{R}, C = A; \text{ b) } x \in \left[-4; \frac{4\sqrt{5}}{5}\right]; \text{ c) } f(g(x)) = \sqrt{16 - (x + |x|)^2}, g(f(x)) = 2\sqrt{16 - x^2} \right]$$

$$\text{a) } f(x) = \sqrt{16 - x^2} \quad 16 - x^2 \geq 0 \quad x^2 \leq 16 \quad -4 \leq x \leq 4$$

$$A = \text{dom } f = [-4, 4]$$

$$g(x) = x + |x|$$

$$B = \text{dom } g = \mathbb{R}$$

$$C = A \cap B = [-4, 4] \cap \mathbb{R} = [-4, 4]$$

$$\text{b) } f(x) \geq g(x) \quad x \in C$$


$$\begin{cases} \sqrt{16 - x^2} \geq x + |x| \\ -4 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$x \in C$

$$\text{①} \begin{cases} x + |x| < 0 \\ 16 - x^2 \geq 0 \\ -4 \leq x \leq 4 \end{cases} \quad \vee \quad \text{②} \begin{cases} x + |x| \geq 0 \\ 16 - x^2 \geq (x + |x|)^2 \\ -4 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

Osserviamo che $x + |x| \geq 0 \quad \forall x$. Infatti essa è uguale a

$$\begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



Il sistema ① è IMPOSSIBILE

Il sistema ② è invece

$$\begin{cases} 16 - x^2 \geq x^2 + 2x|x| + x^2 \\ -4 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 2x|x| - 16 \leq 0 \\ -4 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 2x^2 - 16 \leq 0 \\ 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} 3x^2 - 2x^2 - 16 \leq 0 \\ -4 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 2x^2 - 16 \leq 0 \\ 0 \leq x \leq 4 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 3x^2 - 2x^2 - 16 \leq 0 \\ -4 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x^2 \leq 16 \\ 0 \leq x \leq 4 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x^2 \leq 16 \\ -4 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{4}{\sqrt{5}} \leq x \leq \frac{4}{\sqrt{5}} \\ 0 \leq x \leq 4 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} -4 \leq x \leq 4 \\ -4 \leq x < 0 \end{cases}$$

⇓

$$0 \leq x \leq \frac{4}{\sqrt{5}} \quad \vee \quad -4 \leq x < 0 \quad \Rightarrow \quad -4 \leq x \leq \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$x \in \left[-4, \frac{4}{\sqrt{5}}\right]$$

C) SENZA PREOCCUPARSI DEI DOMINI

$$f(x) = \sqrt{16 - x^2} \quad g(x) = x + |x|$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + |x|) = \sqrt{16 - (x + |x|)^2}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{16 - x^2}) = \sqrt{16 - x^2} + |\sqrt{16 - x^2}| = \sqrt{16 - x^2} + \sqrt{16 - x^2} = 2\sqrt{16 - x^2}$$

$$\sqrt{16 - (x + |x|)^2} = 2\sqrt{16 - x^2}$$

↙ elevo al quadrato

$$16 - (x + |x|)^2 = 4(16 - x^2)$$

$$16 - (x^2 + x^2 + 2x|x|) = 64 - 4x^2$$

$$16 - 2x^2 - 2x|x| = 64 - 4x^2$$

$$2x^2 - 2x|x| = 48$$

$$2x^2 - 2x|x| = 48$$

$$x^2 - x|x| = 24$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 - x^2 = 24 \\ 0 = 24 \\ \text{IMPOSSIBILE} \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} x < 0 \\ x^2 + x^2 = 24 \\ 2x^2 = 24 \\ x^2 = 12 \end{cases}$$

$$x = \pm \sqrt{12} \begin{cases} x = \sqrt{12} \text{ N.A.C.C.} \\ x = -\sqrt{12} \end{cases}$$

L'unica candidata soluzione è $-\sqrt{12}$, da controllare sostituendo nel testo dell'equazione di partenza

$$\sqrt{16 - (x + |x|)^2} = 2\sqrt{16 - x^2} \quad x = -\sqrt{12}$$

$$\sqrt{16 - \underbrace{(-\sqrt{12} + \sqrt{12})^2}_0} = 2\sqrt{16 - 12}$$

$$\sqrt{16} = 2\sqrt{4}$$

$$4 = 4 \quad \text{VERA!}$$

$$-\sqrt{12} = -2\sqrt{3} \text{ è}$$

SOLUZIONE