


RAPPORTO INCREMENTALE

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ I intervallo

$x_0 \in I$ $h \neq 0$ tale che $x_0 + h \in I$



RAPPORTO INCREMENTALE DI f
RIFERITO A x_0 E ALL'INCREMENTO h

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

È il COEFFICIENTE ANGOLARE
della retta PQ

$P(x_0, f(x_0))$ $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$

ESEMPIO

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$


$$\begin{aligned} x_0 = 1 \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} = \frac{\cancel{1} + h^2 + 2h - \cancel{1}}{h} = \\ &= \frac{h^2 + 2h}{h} = \frac{h(h+2)}{h} = 2 + h \end{aligned}$$

Se x_0 è generico

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{\cancel{x_0^2} + h^2 + 2x_0h - \cancel{x_0^2}}{h} \\ &= \frac{h(h+2x_0)}{h} = 2x_0 + h \end{aligned}$$


DERIVATA IN UN PUNTO

PROBLEMA: Data $y = f(x)$ e $x_0 \in \text{dom} f$, trovare la **TANGENTE** al grafico della funzione nel punto $(x_0, f(x_0))$



IDEA

Considerare incrementi h sempre più piccoli $h \rightarrow 0$



$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ = coeff. angolare della secante

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

= coeff. angolare della tangente \rightarrow **DERIVATA** di f in x_0
e si denota con $f'(x_0)$

DEFINIZIONE

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$
 \downarrow
INTERVALLO

$x_0 \in I$ si dice DERIVATA di f in x_0 il limite (se esiste)


$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

Diciamo che f è DERIVABILE in x_0 se $f'(x_0)$ esiste FINITA.

ESEMPI


1) Calcolare la derivata di $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$ in $x_0 = 1$ e in x_0 generico

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \dots = \lim_{h \rightarrow 0} (2+h) = 2$$



$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \dots = \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0+h) = 2x_0$$

2) Calcolare la derivata di $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \sqrt{x}$ in $x_0 = 0$



$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - \overbrace{f(0)}^{=0}}{h} =$$

\swarrow
h non può essere < 0

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$f'(0) = +\infty$ ma f non è derivabile in 0

\Downarrow
la tangente è verticale (retta $x=0$)


Una notazione alternativa per la derivata è $\frac{dy}{dx}$

Altre notazioni sono Df , $\frac{d}{dx} f$, y'

Il limite del rapporto incrementale esiste se sono uguali i due limiti per $h \rightarrow 0^+$ e $h \rightarrow 0^-$.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_+(x_0) \quad \begin{array}{l} \text{DERIVATA} \\ \text{DESTRA} \end{array} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_-(x_0) \quad \begin{array}{l} \text{DERIVATA} \\ \text{SINISTRA} \end{array}$$

Calcoliamo le derivate destra e sinistra in $x_0 = 0$ di $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



$$f(x) = \sqrt{|x|}$$


$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|0+h|} - \sqrt{|0|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} = +\infty$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{|0+h|} - \sqrt{|0|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{|h|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-h}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-h}}{h} \cdot \frac{\sqrt{-h}}{\sqrt{-h}} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h\sqrt{-h}} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-1}{\sqrt{-h}} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

$f'_+(0) = +\infty$ $f'_-(0) = -\infty$ In generale, quando derivate destra e derivate sinistra sono infiniti opposti in x_0 , si dice che x_0 è una CUSPIDE

Consideriamo $f(x) = |x|$



$$f'_+(0) = 1$$

$$f'_-(0) = -1$$

In generale, se $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ esistono diverse e almeno una delle due è finita, si dice che x_0 è un PUNTO ANGOLOSO

Sia \sqrt{x} che $\sqrt{|x|}$ che $|x|$ NON sono derivabili in 0.